

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- La aplicación de **BASTACK F3** debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad.
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- **BASTACK F3** no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Solamente cuando se está consciente, enjuagar la boca, dar mucho agua a beber (aprox. 500 ml) No provocar el vómito. Siempre consultar al médico.
- **Inhalatorio:** No contiene sustancias volátiles.
- **Ocular:** Lavar inmediatamente durante tanto tiempo como sea posible con mucho agua. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Siempre consultar al médico.
- **Dérmico:** Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente.

NOTA AL MEDICO:
 En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.

ANTÍDOTO: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.
 TELEFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 MICROBIAL CONTROL: (51) 954-774-045 / 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No deseche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

BASTACK F3

PLAGUICIDA BIOLOGICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Bacillus thuringiensis var. konkukian 3 g/L
 Bacillus thuringiensis var. kurstaki nat 4 g/L
 Bacillus thuringiensis var. entomocidus 4 g/L

Reg. N° 250-SENASA-PBA-ACBM

TITULAR DE REGISTRO:

MICROBIAL CONTROL S.A.C.

RUC: 20610329986

Dirección: Calle Olivos Mz. D, Lt. 07, Villa El Salvador, Lima, Lima
 Teléfono de contacto: 954-774-045 / 992-773-871

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

MICROBIAL CONTROL S.A.C.

Dirección: Calle Olivos Mz. D, Lt. 07, Villa El Salvador, Lima, Lima
 Teléfono de contacto: 954-774-045 / 992-773-871



N° de lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Contenido neto:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **BASTACK** es una línea de productos en base a subespecies silvestres de la bacteria Bacillus thuringiensis formulado para el control de Lepidópteros. La formulación SL (Concentrado soluble) contiene bacterias activas y endotoxinas producidas por Bacillus thuringiensis que resulta en un rápido control de larvas de Lepidópteros y amplio espectro. Adicionalmente, los polipeptidos de **BASTACK F3** estimula el incremento de defensas naturales contra diversas plagas. Asimismo es ideal para superar situaciones de estrés en los cultivos por su contenido de péptidos. **BASTACK F3** actúa por ingestión. Luego de la ingesta letal de **BASTACK F3** las larvas dejan de ingerir follaje al cabo de dos horas. La mortandad se produce entre el 2° y 3° día de ingesta del follaje tratado.
- Por su origen natural **BASTACK F3** no daña el fruto y no produce manchas ni aromas.
- No mezclar con azufre ni productos alcalinos.
- Evitar niveles muy altos de pH en el tanque de aplicación.
- Por su rápida degradación e inocuidad no tiene residualidad en fruto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad		Dosis (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palma aceitera	Peleopoda	<i>Peleopoda sp.</i>	2.5 - 3	Exento	Exento

LMR = Limite Maximo de Residuos
 PC = Periodo de Carenia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar en los periodos de máximo requerimiento nutricional como brotamiento, trasplante, floración y fructificación. Asimismo para incrementar las defensas contra plagas al inicio del ataque de estas. Con una frecuencia de 2 a 3 aplicaciones en intervalos de 4 a 7 días.

PERIODO DE REINGRESO: Después de 4 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con pesticidas de uso frecuente excepto aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

